

Ace-031

Protocolo de Uso y Dosificación

Inhibición de la miostatina • Aumento de masa muscular • Fuerza y regeneración

¿Qué es el Ace-031?

El **Ace-031** es una proteína de fusión que actúa como un receptor de activina tipo IIB soluble. Su función principal es actuar como una **trampa molecular**, uniéndose a las proteínas miostatina y activina A, que son inhibidores naturales del crecimiento muscular. Al neutralizarlas, el Ace-031 promueve un aumento significativo de la masa muscular magra y la fuerza. Es un péptido altamente especializado, originalmente desarrollado para tratar enfermedades de desgaste muscular como la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD).

Inhibe la miostatina

Aumenta masa muscular

Mejora la fuerza

Recuperación avanzada

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico y deje secar completamente.
PASO 2	El vial es de 1 mg. Añada 1 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Inserte la aguja e inyecte el agua lentamente por la pared interior del vial.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver por completo. NO agitar con fuerza.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C inmediatamente. Vida útil: hasta 30 días refrigerado.

Concentración resultante: 1 mg en 1 ml = 1 mg/ml. Cada 0.1 ml (10 unidades) = 100 mcg de Ace-031.

Protocolo de Dosificación

El Ace-031 se aplica vía subcutánea, generalmente en **ciclos poco frecuentes** debido a su efecto potente y prolongado en el organismo.

NIVEL	DOSIS POR APLICACIÓN	UNIDADES (vial 1 mg + 1 ml BAC)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Principiante	0.5 mg	50 u	1 vez cada 4 semanas	8-12 semanas
Intermedio	0.75-1 mg	75-100 u	1 vez cada 4 semanas	8-12 semanas

■ La miostatina y la activina A también regulan el tejido cardíaco, por lo que su inhibición excesiva podría implicar riesgos cardiovasculares. El uso del Ace-031 debe ser muy controlado, idealmente bajo supervisión médica, y no está indicado para uso recreativo.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen — subcutáneo, rotando puntos de inyección
Técnica	Pellizque la piel, inserte la aguja a 45-90° e inyecte lentamente
Rotación	Cambie el punto de inyección en cada aplicación
Momento	Un horario consistente, preferiblemente a la misma hora del día programado
Frecuencia	1 aplicación cada 4 semanas, según el nivel del protocolo

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuándo se notan los resultados?

Los aumentos en la masa muscular suelen ser notorios a partir de las 2-4 semanas tras la primera inyección, con efectos que pueden durar semanas después de la última dosis. Su efecto es acumulativo, por lo que la baja frecuencia de aplicación es suficiente.

P: ¿Cuáles son los efectos secundarios?

La miostatina también regula el tejido cardíaco, por lo que la inhibición excesiva podría tener riesgos cardiovasculares. El uso debe ser muy controlado. Puede causar fatiga, dolor en piernas y encías sangrantes. No es para uso recreativo.

P: ¿Por qué la frecuencia de aplicación es tan baja?

El Ace-031 tiene una vida media prolongada y un efecto biológico acumulativo y duradero sobre la vía de la miostatina. Aplicaciones más frecuentes no aportan beneficios adicionales y aumentan considerablemente el riesgo de efectos adversos, por lo que se respeta un intervalo mínimo de 4 semanas.

P: ¿Precio en Reset Peptides?

Ace-031 1 mg → \$1,188 MXN por vial.

P: ¿Cómo almaceno el vial?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días. No congelar después de reconstituir.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Por su perfil de potencia y los posibles riesgos cardiovasculares de la inhibición de miostatina, no se recomienda combinarlo con otros péptidos sin supervisión médica estricta. Cualquier combinación debe evaluarse individualmente con un profesional de la salud.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado