

BPC-157 + TB-500

Protocolo de Uso y Dosificación

La combinación sinérgica definitiva para lesiones, inflamación y recuperación avanzada

¿Qué es el Blend BPC-157 / TB-500?

Este blend combina las dos moléculas regenerativas más potentes en un solo vial. El **BPC-157** actúa localmente reparando tendones, ligamentos y mucosa, mientras que el **TB-500** reduce la inflamación sistémica y promueve la migración celular. Al usarse juntos, se obtiene una sinergia que acelera la recuperación de lesiones complejas (desgarros múltiples, cirugías, artritis severa) en un tiempo récord. Es el preferido por atletas de alto rendimiento y personas con lesiones crónicas que no responden a otros tratamientos.

Sinergia total	Doble mecanismo	Recuperación acelerada	Ideal para lesiones complejas
----------------	-----------------	------------------------	-------------------------------

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico y deje secar.
PASO 2	Su blend puede ser 5 mg BPC + 5 mg TB o 10 mg + 10 mg. Añada 2 ml de agua bacteriostática para cualquiera de las dos presentaciones.
PASO 3	Inyecte el agua por la pared interior del vial, lentamente. Nunca directo al polvo.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver completamente. NO agitar con fuerza.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días reconstituido (por seguridad, no alargue más).

Concentración estándar (2 ml BAC): Blend 5/5 → cada 0.1 ml (10 u) = 0.25 mg de BPC + 0.25 mg de TB. Blend 10/10 → cada 0.1 ml (10 u) = 0.5 mg de BPC + 0.5 mg de TB.

Protocolo de Dosificación

El blend se aplica subcutáneo (sistémico o local) y se puede usar todos los días o 5 días a la semana. La dosis se basa en la cantidad de BPC (el TB acompañará proporcionalmente).

NIVEL	DOSIS DIARIA de BPC	Blend 5/5 (unidades)	Blend 10/10 (unidades)	OBJETIVO	DURACIÓN
Principiante (mantenimiento)	250 mcg BPC	10 u	5 u	Prevención, salud articular	2-4 semanas
Intermedio (lesión moderada)	500 mcg BPC	20 u	10 u	Tendinitis, desgarros grado I	4-6 semanas
Avanzado (lesión severa / post cirugía)	1 mg BPC	40 u	20 u	Rupturas, cirugía, artritis	6-8 semanas

Nota: Algunos usuarios avanzados aplican dos veces al día (mañana y noche) a 500 mcg de BPC por dosis (1 mg BPC total diario). Eso equivale a 20 u del blend 5/5 dos veces al día.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Subcutáneo en abdomen o cerca de la lesión (ideal para efecto local)
Técnica	Pellizcar la piel, inyectar a 45-90°, lento
Rotación	Cambie puntos; si es local, rote alrededor de la lesión
Momento	Mañana o noche, de forma consistente
Frecuencia	Diario o 5 días a la semana (lunes a viernes)

Preguntas Frecuentes

P: ¿Por qué comprar el blend en lugar de los dos por separado?

Comodidad y precisión. Al estar ya mezclados en proporción 1:1, aseguras que siempre recibes la misma relación terapéutica. Además, reduces el número de inyecciones (una en lugar de dos).

P: ¿Cuánto tarda en actuar?

Muchos usuarios notan reducción del dolor a los 2-3 días. La reparación visible de tejidos suele tomar de 2 a 4 semanas. En lesiones quirúrgicas, la recuperación funcional se acelera notablemente.

P: ¿Puedo usar el blend para problemas digestivos?

Sí, el BPC-157 es excelente para intestino permeable, Crohn o colitis. El TB-500 también ayuda con la inflamación intestinal sistémica. Es una opción completamente válida.

P: ¿Efectos secundarios?

Muy raros. Puede haber leve molestia local en el sitio de inyección. En dosis altas (>1 mg de BPC diario), algunos reportan ligera fatiga o mareo, que cede al reducir la dosis.

P: ¿Qué presentaciones y precios tienen?

En Reset Peptides: BPC-157 + TB-500 5 mg / 5 mg → \$1,338 MXN BPC-157 + TB-500 10 mg / 10 mg → \$2,226 MXN

P: ¿Almacenamiento?

Liofilizado: lugar fresco y seco a temperatura ambiente. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días. No congelar después de reconstituir.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado