

Cartalax (AED)

Triple Péptido · Protocolo de Uso y Dosificación

Regeneración de cartílago y hueso • Modulación del metabolismo del tejido conectivo • Articulaciones

¿Qué es el Cartalax?

El **Cartalax** (Ala-Glu-Asp, T-31, AED) es un tripéptido desarrollado originalmente en Rusia, diseñado para apoyar el metabolismo del cartílago y el tejido óseo. Su función principal es modular las rutas celulares para promover la síntesis de la matriz del cartílago. Actúa a nivel mitocondrial ayudando a las células a manejar mejor el estrés, y se ha estudiado *in vitro* por sus efectos antienviejecimiento. Está indicado para la preservación del tejido cartilaginoso, la reducción de la inflamación y la reparación articular.

Soporte y reparación articular	Modulación del tejido conectivo	Preservación del cartílago	Antiinflamatorio
--------------------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón de goma del vial con alcohol isopropílico y deje secar completamente.
PASO 2	Para el vial de 20 mg, añada 2 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Inserte la aguja e inyecte el agua lentamente por la pared interior del vial. Nunca directo al polvo.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver por completo. NO agitar con fuerza.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C inmediatamente. Vida útil: hasta 30 días refrigerado.

Concentración resultante: 20 mg en 2 ml = 10 mg/ml. Cada 0.1 ml (10 unidades) = 1 mg de Cartalax.

Protocolo de Dosificación

El Cartalax se aplica vía subcutánea en el abdomen, o cerca del tejido articular afectado para un efecto más localizado.

NIVEL	DOSIS DIARIA	UNIDADES (vial 20 mg + 2 ml BAC)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Principiante (bienestar articular)	1-2 mg	10-20 u	1 vez al día	4 semanas
Intermedio (lesión leve/moderada)	2-5 mg	20-50 u	1 vez al día	6-8 semanas
Avanzado (artritis / post cirugía)	5-10 mg	50-100 u	1-2 veces al día	8-12 semanas

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen (subcutáneo) o cerca de la articulación afectada para efecto local
Técnica	Pellizque la piel, inserte la aguja a 45-90° e inyecte lentamente
Rotación	Cambie el punto de inyección en cada aplicación
Momento	Un horario consistente, preferiblemente a la misma hora cada día
Frecuencia	1-2 veces al día según el nivel del protocolo

Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuánto tarda en notar la mejoría articular?

La reducción de la inflamación y el dolor se nota a menudo en las primeras 2 semanas. La reparación del cartílago es un proceso más lento que toma de 4 a 8 semanas. Se recomienda combinarlo con TB-500 o BPC-157 para una sinergia superior en lesiones complejas.

P: ¿Se puede inyectar directamente en la articulación?

No se recomienda la inyección intraarticular sin supervisión médica. La vía subcutánea local (al lado de la articulación) o sistémica es suficiente para obtener los beneficios del péptido.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

Es muy bien tolerado. Puede causar leve enrojecimiento o molestia en el punto de inyección. No se conocen efectos adversos graves.

P: ¿Precio en Reset Peptides?

Cartalax 20 mg → \$1,487 MXN por vial.

P: ¿Cómo almaceno el vial?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Sí. La combinación con BPC-157 y/o TB-500 es ideal para lesiones articulares complejas: estos péptidos reparan tendones, ligamentos y reducen la inflamación sistémica, mientras el Cartalax apoya específicamente la regeneración del cartílago y el tejido óseo.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado