

Cerebrolysin

Protocolo de Uso y Dosificación - Reset Peptides

Neuroprotector • Reparación cognitiva • Accidente cerebrovascular • Demencia • Memoria

¿Qué es el Cerebrolysin?

El **Cerebrolysin** es un fármaco peptidérgico derivado de proteínas cerebrales porcinas, con décadas de uso clínico en Europa y Asia. Contiene una mezcla de péptidos de bajo peso molecular que cruzan la barrera hematoencefálica y ejercen múltiples efectos neuroprotectores: promueven la neuroplasticidad (crecimiento de nuevas neuronas y sinapsis), inhiben la apoptosis (muerte celular programada), modulan la inflamación cerebral, estabilizan la barrera hematoencefálica y mejoran el metabolismo energético de las neuronas. Está indicado para accidentes cerebrovasculares (ACV), traumatismos craneoencefálicos, enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, deterioro cognitivo leve y trastornos del neurodesarrollo (como autismo, bajo supervisión médica).

Neuroprotector

Promueve neuroplasticidad

Reduce inflamación cerebral

Mejora memoria y cognición

Presentación y Reconstitución

El Cerebrolysin generalmente se presenta en ampollas líquidas estériles (no requiere reconstitución). En tu inventario aparece como 60 mg. Es probable que se trate de una ampolla de 5 ml (concentración 12 mg/ml) o 10 ml. Como no tengo el volumen exacto, asumiré que es una ampolla de 5 ml (lo más común).

Si viene en polvo liofilizado:

Reconstituir con el volumen de agua bacteriostática indicado en el envase (generalmente 2-5 ml). Si no hay instrucción, use 2 ml para un vial de 60 mg.

Importante: El Cerebrolysin es un medicamento registrado en varios países. Su uso debe ser siempre bajo supervisión médica, especialmente por vía intravenosa.

Protocolo de Dosificación

El Cerebrolysin se administra por vía intramuscular (IM) para dosis ≤ 5 ml, o intravenosa (IV) lenta para dosis > 5 ml. Nunca por vía subcutánea.

NIVEL	DOSIS DIARIA	VÍA	FRECUENCIA	DURACIÓN DEL CICLO
Principiante / Mantenimiento	1-2 ml	IM	1 vez/día	10-20 días
Intermedio (deterioro cognitivo)	5 ml	IM o IV lenta	1 vez/día, 5 días a la semana	4 semanas
Avanzado (ACV, TCE, Alzheimer)	10-30 ml	IV lenta (en hospital)	1 vez/día	10-20 días, repetir cada 3-6 meses

Para la presentación de 60 mg (asumiendo 5 ml): cada ml contiene 12 mg de péptidos. Si necesita dosis menores (ej. 2 ml = 24 mg), ajuste según el volumen.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Vía	Técnica	Observaciones
Intramuscular (IM)	Aguja 1-1.5 pulgadas, ángulo 90°, en glúteo o vasto lateral del muslo. Inyectar lentamente.	Máximo 5 ml por sitio. Si la dosis es mayor, dividir en dos glúteos.
Intravenosa (IV)	Administración lenta en hospital o clínica (bajo supervisión médica).	Para dosis >5 ml o pacientes graves. No hacer en casa.
Rotación	Alterne los sitios de inyección IM (glúteo derecho/izquierdo).	
Momento	Preferible por la mañana para no interferir con el sueño (puede ser ligeramente activador).	

¿Cuándo se Notan los Resultados?

Tiempo	Efectos esperados (depende de la condición)
Días 1-7	En ACV agudo: mejora de la conciencia y función neurológica temprana. En pacientes con demencia: ligera mejoría en el estado de alerta.
Semana 2-4	Mejora de la memoria a corto plazo, la fluidez verbal y la capacidad de concentración.
Fin del ciclo (10-20 días)	Beneficios significativos en la función cognitiva y motora.
Meses después (ciclos repetidos)	Ralentización de la progresión de la demencia, recuperación funcional sostenida.

Precios Reset Peptides

- Cerebrolysin 60 mg → \$1,241 MXN (presentación: ampolla o vial)

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Se puede usar en casa?

R: Las inyecciones IM de hasta 5 ml pueden ser administradas por un profesional de la salud en el hogar o por el propio paciente si tiene experiencia y técnica aséptica. Las dosis intravenosas requieren entorno clínico.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

R: Es muy seguro. Puede causar enrojecimiento o dolor local en el sitio de inyección IM. Raramente, mareos, náuseas o agitación leve. Muy raramente, reacciones alérgicas (urticaria, dificultad respiratoria). Suspenda si aparece.

P: ¿Cuántos ciclos se pueden hacer al año?

R: Generalmente 2-4 ciclos al año, espaciados al menos 3 meses. Consulte con un neurólogo.

P: ¿Puedo combinarlo con otros nootrópicos?

R: Sí, a menudo se combina con Semax o Selank para potenciar la recuperación cognitiva. Pero siempre bajo supervisión médica.

¿Tienes más dudas?

resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado