

Kisspeptin

Protocolo de Uso y Dosificación - Reset Peptides

Regulador maestro de la fertilidad • Estimula el eje HPG • Libido • Función gonadal

¿Qué es la Kisspeptina?

La **Kisspeptina** es una hormona natural codificada por el gen KISS1, que actúa como el regulador maestro del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal (HPG). Estimula las neuronas de GnRH (hormona liberadora de gonadotropinas), lo que a su vez aumenta la liberación de LH y FSH desde la hipófisis. En consecuencia, mejora la producción de testosterona en hombres y la ovulación en mujeres. Es útil para aumentar la libido, tratar la infertilidad (por causas centrales), restaurar la función gonadal en hipogonadismo secundario, y como alternativa a la terapia de reemplazo de testosterona (sin suprimir la producción endógena). También se usa en mujeres con trastornos del ciclo menstrual o para mejorar la respuesta en tratamientos de fertilidad.

Actúa sobre GnRH

Aumenta LH y FSH

Mejora testosterona y ovulación

Aumenta la libido

Reconstitución del Vial

PASO 1 Limpie el tapón con alcohol.

PASO 2 Para cualquier vial (5 mg o 10 mg), añada 2 ml de agua bacteriostática.

PASO 3 Inyecte por la pared interior, lentamente.

PASO 4 Gire suavemente hasta disolver.

PASO 5 Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días.

Concentración resultante (2 ml BAC):

- Vial 5 mg → 2.5 mg/ml → cada 0.1 ml (10 unidades) = 250 mcg
- Vial 10 mg → 5 mg/ml → cada 0.1 ml (10 unidades) = 500 mcg

Protocolo de Dosificación

La Kisspeptina se aplica vía subcutánea en el abdomen. La dosis varía según el objetivo. Se puede usar a diario o 2-3 veces por semana (efecto acumulativo). Los picos de LH ocurren 20-40 minutos después de la inyección.

Precios Reset Peptides

- Kisspeptin 5 mg → \$663 MXN
- Kisspeptin 10 mg → \$1,038 MXN

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

NIVEL	DOSIS POR APLICACIÓN	Vial 5 mg + 2 ml (unidades)	Vial 10 mg + 2 ml (unidades)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Principiante (libido, bienestar)	100 mcg	4 unidades (use jeringa 0.3 ml)	2 unidades	1 vez/día o día por medio	4 semanas
Intermedio (hipogonadismo leve)	200 mcg	8 unidades	4 unidades	1-2 veces/día (mañana y noche)	6-8 semanas
Avanzado (infertilidad, hipogonadismo severo)	300-500 mcg	12-20 unidades	6-10 unidades	2 veces/día	8-12 semanas

Nota sobre la medición: Para dosis de 100 mcg en vial de 5 mg (4 unidades), es difícil pero posible con jeringas de 0.3 ml (30 unidades) que tienen marcas por cada 1 unidad. Si el cliente no tiene esa jeringa, puede diluir el vial con 4 ml de agua → concentración 1.25 mg/ml → 10 u = 125 mcg → 100 mcg = 8 unidades, más fácil.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen (subcutáneo)
Técnica	Pellizcar, inyectar lento
Rotación	Cambie de punto diario
Momento	Mañana y/o noche, sin relación con comidas
Frecuencia	1-2 veces al día, según protocolo

¿Cuándo se Notan los Resultados?

Tiempo	Efectos esperados
Días 1-7	Aumento de la libido y deseo sexual en hombres y mujeres (efecto rápido).
Semana 2-4	Mejora de la función eréctil (hombres), lubricación (mujeres), mayor energía.
Semana 4-6	Aumento de testosterona en análisis de sangre (si había hipogonadismo). Regulación del ciclo menstrual.
Semana 8-12	Mejora de la fertilidad (recuento y calidad espermática, ovulación regular).

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo usar Kisspeptina si ya tomo testosterona exógena?

R: No tiene sentido. La testosterona exógena suprime el eje HPG, por lo que la Kisspeptina no podrá aumentar los niveles (el eje está "apagado"). La Kisspeptina es útil como alternativa para restaurar la producción endógena sin suprimir.

P: ¿Aumenta la testosterona en hombres sanos?

R: En hombres con niveles normales, puede producir un aumento transitorio, pero no está indicada para "optimización" deportiva. Se usa principalmente para restaurar niveles bajos por hipogonadismo secundario.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

R: Puede causar leve enrojecimiento en el sitio de inyección, sofocos (por la liberación de LH), o ligeras náuseas. Es bien tolerado.

P: ¿Pueden usarla las mujeres?

R: Sí, especialmente para el trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH), síndrome de ovario poliquístico (SOP), o para regular el ciclo menstrual. También en tratamientos de fertilidad para inducir la ovulación.

P: ¿Cuánto dura el vial reconstituido?

R: 30 días en nevera. Deseche cualquier resto después de ese tiempo.

¿Tienes más dudas?

resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.