

KPV (Lys-Pro-Val)

Protocolo de Uso y Dosificación - Reset Peptides

Antiinflamatorio potente • Piel, articulaciones, sistema gastrointestinal

¿Qué es el KPV?

El **KPV** es un tripéptido (Lys-Pro-Val) derivado de la hormona estimulante de melanocitos (α -MSH). Actúa inhibiendo la vía NF- κ B y la interleucina-1 β (IL-1 β), dos actores centrales en los procesos inflamatorios. Es el antiinflamatorio más puro y selectivo en el mundo de los péptidos. Ideal para afecciones inflamatorias de la piel (psoriasis, dermatitis, rosácea), articulaciones (artritis, tendinitis), y el sistema gastrointestinal (colitis, Crohn, intestino permeable). No es un analgésico (no enmascara el dolor), sino que trata la causa raíz: la inflamación.

Antiinflamatorio potente

Reduce IL-1 β y NF- κ B

Piel, articulaciones, GI

Sin efectos secundarios graves

Reconstitución del Vial

PASO 1 Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico.

PASO 2 Para cualquier vial de KPV (5 mg, 10 mg o 30 mg), añada 2 ml de agua bacteriostática.

PASO 3 Inyecte el agua lentamente por la pared interior del vial. Nunca directo al polvo.

PASO 4 Gire suavemente hasta disolver. NO agitar con fuerza.

PASO 5 Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días.

Concentración resultante (2 ml BAC):

- Vial 5 mg $\rightarrow$ 2.5 mg/ml $\rightarrow$ 10 unidades (0.1 ml) = 250 mcg
- Vial 10 mg $\rightarrow$ 5 mg/ml $\rightarrow$ 10 unidades (0.1 ml) = 500 mcg
- Vial 30 mg $\rightarrow$ 15 mg/ml $\rightarrow$ 10 unidades (0.1 ml) = 1.5 mg

Consejo para vial de 30 mg: Si necesita dosis pequeñas (200-400 mcg), es mejor reconstituir con 4 ml de agua en lugar de 2 ml. Así la concentración será 7.5 mg/ml $\rightarrow$ 10 unidades = 750 mcg $\rightarrow$ 200 mcg $\approx$ 2.7 unidades (aún pequeñas, pero más fáciles de medir con jeringa de 0.3 ml). O simplemente recomiende al cliente usar el vial de 5 mg o 10 mg para dosis bajas.

Protocolo de Dosificación

El KPV se aplica vía subcutánea en el abdomen, preferiblemente cerca de la zona inflamada (para afecciones locales) o en abdomen (para efecto sistémico). Dosis por toma.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

NIVEL	DOSIS DIARIA	Vial 5 mg + 2 ml (unidades)	Vial 10 mg + 2 ml (unidades)	Vial 30 mg + 2 ml (unidades)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Principiante (inflamación leve)	200 mcg	8 unidades	4 unidades	1.3 unidades (difícil)	1 vez/día	4 semanas
Intermedio (afección moderada)	400 mcg	16 unidades	8 unidades	2.7 unidades	1 vez/día	6-8 semanas
Avanzado (inflamación severa)	600 mcg	24 unidades	12 unidades	4 unidades	1-2 veces/día	8-12 semanas

Recomendación para vial de 30 mg: Para facilitar la medición, diluya con 4 ml de BAC (concentración 7.5 mg/ml). Entonces: 200 mcg = 2.7 unidades (use jeringa de 0.3 ml); 400 mcg = 5.3 unidades; 600 mcg = 8 unidades.

Cómo Aplicarlo Correctamente	
Zona	Abdomen (subcutáneo) o cerca de la lesión
Técnica	Pellizcar, inyectar a 45-90°, lento
Rotación	Cambie de punto diario
Momento	Mañana o noche, sin relación con comidas
Frecuencia	1-2 veces al día según nivel

¿Cuándo se Notan los Resultados?	
Tiempo	Efectos esperados
Semana 1-2	Reducción notable de enrojecimiento, hinchazón y dolor en zonas inflamadas
Semana 3-4	Mejora sostenida de la función intestinal (menos diarrea, menos dolor)
Semana 5-8	Cicatrización de lesiones cutáneas crónicas, mejor movilidad articular
Semana 8-12	Efectos acumulativos antiinflamatorios, reducción de marcadores sistémicos

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

Precios Reset Peptides

- KPV 5 mg → \$599 MXN
- KPV 10 mg → \$813 MXN
- KPV 30 mg → \$2,226 MXN

Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo usar KPV junto con antiinflamatorios como ibuprofeno?

R: Sí, no hay interacciones conocidas. Sin embargo, muchos usuarios logran reducir o eliminar los AINEs después de unas semanas de KPV, siempre consultando con su médico.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

R: Es extremadamente seguro. Raramente, en dosis altas (>1 mg/día), puede causar leve sequedad en la piel o ligera fatiga inicial. No se conocen toxicidades.

P: ¿Cuánto dura el vial una vez reconstituido?

R: 30 días en nevera (2-8°C). Después de ese tiempo, deseche cualquier resto.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

R: Sí, forma parte del stack KLOW junto con BPC-157, TB-500 y GHK-Cu para un protocolo regenerativo y antiinflamatorio completo.

¿Tienes más dudas?

resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.