

Melanotan I (Afamelanotide)

Protocolo de Uso y Dosificación - Reset Peptides

Bronceado controlado • Protección solar • Seguro y limpio

¿Qué es el Melanotan I?

El **Melanotan I** (Afamelanotide) es un análogo sintético de la hormona estimulante de melanocitos (α -MSH). Actúa selectivamente sobre el receptor MC1R de la piel, estimulando la producción de melanina (el pigmento que broncea y protege la piel). A diferencia del Melanotan II, el Melanotan I no cruza la barrera hematoencefálica en cantidades significativas, por lo que tiene menos efectos secundarios a nivel central (no produce náuseas intensas ni erecciones espontáneas). Es ideal para personas que buscan un bronceado natural, uniforme, con protección contra los rayos UV (reduce el riesgo de quemaduras) y con un perfil de seguridad más limpio. También se utiliza médicamente para tratar la erupción polimorfa lumínica (alergia al sol) y la protoporfiria eritropoyética.

Bronceado natural

Protege contra UV

Sin efectos secundarios
centrales

Ideal para pieles claras

Reconstitución del Vial

PASO 1 Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico.

PASO 2 El vial es de 10 mg. Añada 2 ml de agua bacteriostática.

PASO 3 Inyecte el agua lentamente por la pared interior del vial. Nunca directo al polvo.

PASO 4 Gire suavemente hasta disolver. NO agitar con fuerza.

PASO 5 Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30-60 días.

Concentración resultante:

10 mg / 2 ml = 5 mg/ml → cada 0.1 ml (10 unidades) = 500 mcg (0.5 mg).

Precio Reset Peptides: Melanotan I 10 mg → \$663 MXN

Protocolo de Dosificación

El Melanotan I se aplica vía subcutánea en el abdomen. La dosis es más alta que la de Melanotan II (porque es menos potente). Se usa en una fase de carga (hasta alcanzar el tono deseado) seguida de una fase de mantenimiento.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

FASE	DOSIS POR DÍA	UNIDADES (Vial 10 mg + 2 ml)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Carga (piel clara o fototipo bajo)	0.5 - 1 mg	10 - 20 unidades	1 vez al día	10 - 20 días
Carga (piel más oscura o fototipo alto)	0.25 - 0.5 mg	5 - 10 unidades	1 vez al día	10 - 20 días
Mantenimiento (una vez logrado el tono)	0.25 - 0.5 mg	5 - 10 unidades	1 - 3 veces por semana	Indefinido

Recomendación: Comience con 0.25 mg (5 unidades) los primeros 2-3 días para evaluar tolerancia, luego suba a 0.5 mg (10 unidades). Si después de 10 días no ve resultados, puede aumentar a 1 mg (20 unidades). No supere 1 mg al día.

Exposición solar: Para activar el bronceado, se necesita exposición moderada a los rayos UV (sol o cama de bronceado) cada 2-3 días. Comience con pocos minutos (5-10) y aumente gradualmente. Sin exposición, el bronceado será mínimo.

Cómo Aplicarlo Correctamente	
Zona	Abdomen (subcutáneo)
Técnica	Pellizcar, inyectar a 45-90°, lento
Rotación	Cambie de punto diario
Momento	Preferible por la noche (para evitar el malestar inicial durante el día)
Exposición solar	15-30 minutos al sol o en cama de bronceado cada 2-3 días

¿Cuándo se Notan los Resultados?	
Tiempo	Efectos esperados
Días 3-5	Comienza un ligero bronceado, especialmente en zonas expuestas al sol.
Días 10-14	Bronceado notable, más uniforme y duradero que el bronceado natural.
Días 20-30	Bronceado máximo. Pasa a fase de mantenimiento.
Mantenimiento	Con 1-3 dosis a la semana, el bronceado se mantiene durante meses.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Es mejor que el Melanotan II?

R: Depende del objetivo. El Melanotan I es más seguro y con menos efectos secundarios (sin náuseas ni erecciones espontáneas), pero requiere dosis más altas y más días para alcanzar el bronceado. El Melanotan II es más potente y rápido, pero con más efectos secundarios.

P: ¿Necesito tomar sol o puedo broncearme sin él?

R: El Melanotan I estimula la producción de melanina, pero se necesita exposición a los rayos UV para que el pigmento se oxide y oscurezca. Sin sol, el bronceado es muy leve. Con sol moderado, el resultado es espectacular.

P: ¿Produce lunares o pecas?

R: Puede oscurecer lunares y pecas existentes. Si tiene muchos, considere usar protector solar en esas zonas o evitarlo.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

R: Muy pocos. Puede causar leve enrojecimiento local, náuseas leves (mucho menos que MT2), bostezos o sensación de calor. No produce disfunción eréctil ni afecta la libido.

P: ¿Cuánto dura el vial reconstituido?

R: Hasta 60 días en nevera (2-8°C). Después de ese tiempo, deseche.

¿Tienes más dudas?

resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.