

Melanotan II

Protocolo de Uso y Dosificación - Reset Peptides

Bronceado rápido • Efecto afrodisíaco • Mayor potencia

¿Qué es el Melanotan II?

El **Melanotan II** es un análogo sintético de la α -MSH (hormona estimulante de melanocitos) pero con acción no selectiva sobre los receptores de melanocortina. Actúa sobre MC1R (bronceado), MC3R/MC4R (efectos centrales: libido, náuseas, erecciones) y otros. Es mucho más potente que el Melanotan I, produciendo un bronceado rápido y profundo con dosis más bajas. Sin embargo, también produce efectos secundarios significativos: náuseas, bostezos, enrojecimiento facial, y en hombres, erecciones espontáneas (a veces incómodas). Es ideal para quienes buscan un bronceado muy intenso en poco tiempo y no les molestan los efectos secundarios.

Bronceado rápido y profundo

Aumenta la libido (efecto afrodisíaco)

Produce erecciones espontáneas

Más potente que MT1

Reconstitución del Vial

PASO 1 Limpie el tapón con alcohol.

PASO 2 El vial es de 10 mg. Añada 2 ml de agua bacteriostática.

PASO 3 Inyecte por la pared interior, lentamente.

PASO 4 Gire suavemente hasta disolver. NO agitar.

PASO 5 Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30-60 días.

Concentración resultante:

10 mg / 2 ml = 5 mg/ml → cada 0.1 ml (10 unidades) = 500 mcg (0.5 mg).

Precio Reset Peptides: Melanotan II 10 mg → \$663 MXN

Protocolo de Dosificación

El Melanotan II es mucho más potente que el MT1. Las dosis son más bajas. Comience siempre con una dosis muy pequeña para evaluar la tolerancia a las náuseas y otros efectos.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

FASE	DOSIS POR DÍA	UNIDADES (Vial 10 mg + 2 ml)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Prueba de tolerancia (día 1)	50 - 100 mcg	1 - 2 unidades	Una sola vez	-
Carga (días 2-10)	100 - 250 mcg	2 - 5 unidades	1 vez al día	7 - 14 días
Carga avanzada (si tolera bien)	300 - 500 mcg	6 - 10 unidades	1 vez al día	7 - 14 días
Mantenimiento	100 - 250 mcg	2 - 5 unidades	1 - 2 veces por semana	Indefinido

Advertencia: No supere 500 mcg (10 unidades) al día. Dosis más altas aumentan las náuseas y otros efectos sin mejorar significativamente el bronceado.

Exposición solar: Al igual que con MT1, necesita exposición moderada a los rayos UV cada 2-3 días. Con MT2, incluso poca exposición produce un bronceado intenso.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen (subcutáneo)
Técnica	Pellizcar, inyectar lento
Rotación	Cambie de punto diario
Momento	Preferible por la noche (las náuseas pueden durar 30-60 minutos, así que mejor dormir las)
Exposición solar	10-20 minutos al sol o en cama de bronceado cada 2-3 días

¿Cuándo se Notan los Resultados?

Tiempo	Efectos esperados
Días 1-3	Puede notar oscurecimiento de lunares y pecas. El bronceado comienza a ser visible.
Días 5-7	Bronceado notable, incluso con poca exposición solar.
Días 10-14	Bronceado profundo y uniforme. Muchos usuarios alcanzan su tono máximo.
Mantenimiento	Con 1-2 dosis a la semana, el bronceado se mantiene durante meses.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Por qué produce náuseas?

R: Porque activa los receptores MC3R/MC4R en el área postrema del cerebro, la zona que regula el vómito. Las náuseas suelen durar 20-40 minutos y desaparecen con el uso continuo. Inyectar por la noche ayuda a dormirlos.

P: ¿Las erecciones son peligrosas?

R: No, son un efecto secundario común (en hombres). Suelen aparecer 30-60 minutos después de la inyección y pueden durar varias horas. Si la erección es dolorosa o dura más de 4 horas, busque atención médica (priapismo, muy raro con MT2).

P: ¿Puedo usarlo si soy mujer?

R: Sí, muchas mujeres lo usan. Los efectos secundarios en mujeres incluyen náuseas, bostezos y aumento de la libido (deseo sexual). No afecta el ciclo menstrual.

P: ¿Es seguro a largo plazo?

R: Se han reportado casos de oscurecimiento de lunares y, muy raramente, melanoma maligno en personas con predisposición. Si tiene muchos lunares o antecedentes familiares de cáncer de piel, evítelo o consulte a un dermatólogo.

P: ¿Cuánto dura el vial reconstituido?

R: Hasta 60 días en nevera (2-8°C).

¿Tienes más dudas?

resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.