

Ovagen (EDL)

Triple Péptido · Protocolo de Uso y Dosificación

Bioregulador hepático y gastrointestinal · Función hepática · Homeostasis de tejidos GI

¿Qué es el Ovagen?

El **Ovagen** es un tripéptido sintético (Glu-Asp-Leu, EDL) diseñado para dirigirse al tejido hepático y gastrointestinal a través de interacciones péptido-ADN. Es un **bioregulador** que influye en la expresión génica relacionada con la función hepática y la homeostasis gastrointestinal. Forma parte de la familia de péptidos bioreguladores de tejido específico, diseñados para apoyar la regeneración celular, la desintoxicación y la síntesis de proteínas en órganos digestivos clave.

Salud hepática

Función gastrointestinal

Desintoxicación

Síntesis de proteínas

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico.
PASO 2	Para el vial de 20 mg, añada 2 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Inyecte el agua lentamente por la pared interior del vial. Nunca directo al polvo.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver por completo. NO agitar.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días.

Concentración resultante: 20 mg en 2 ml = 10 mg/ml. Cada 0.1 ml (10 unidades) = 1 mg de Ovagen.

Protocolo de Dosificación

El Ovagen se aplica vía subcutánea en el abdomen, preferiblemente en un horario consistente para mantener niveles estables durante el ciclo.

NIVEL	DOSIS DIARIA	UNIDADES (vial 20 mg + 2 ml BAC)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Principiante	1-2 mg	10-20 u	1 vez al día	4 semanas
Intermedio	2-5 mg	20-50 u	1 vez al día	6 semanas
Avanzado	5-10 mg	50-100 u	1 vez al día	8 semanas

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen — subcutáneo, para efecto sistémico
Técnica	Pellizque la piel, inserte la aguja a 45-90° e inyecte lentamente
Rotación	Cambie el punto de inyección en cada aplicación
Momento	Un horario consistente, preferiblemente por la mañana
Frecuencia	1 vez al día según el nivel del protocolo

Preguntas Frecuentes

P: ¿En qué se diferencia Ovagen de Livagen?

Ambos se dirigen al hígado, pero tienen secuencias de aminoácidos diferentes (Ovagen: EDL / Livagen: KEDA) y, por lo tanto, una especificidad de regulación génica potencialmente distinta. Livagen es un tetrapéptido con efectos epigenéticos más amplios sobre el sistema inmunológico, mientras que Ovagen es un tripéptido más específico para la función hepática y gastrointestinal.

P: ¿Para qué tipo de personas está indicado?

Está orientado a personas que buscan apoyar la función hepática y digestiva, especialmente quienes presentan desgaste por la edad, exposición frecuente a toxinas (alcohol, medicamentos) o que desean optimizar su salud gastrointestinal como parte de un protocolo de longevidad.

P: ¿Cuánto tarda en notar resultados?

Como bioregulador de acción gradual, los efectos no son inmediatos. La mejora en marcadores digestivos y de función hepática suele observarse después de 4 a 6 semanas de uso constante, consolidándose hacia el final del ciclo.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Sí. Es común combinarlo con Livagen para un protocolo hepático más completo, o con BPC-157, que también tiene efectos beneficiosos sobre el tracto gastrointestinal. También se combina con NAD+ para potenciar la desintoxicación celular.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

Es muy bien tolerado. Puede causar leve enrojecimiento o molestia en el punto de inyección. No se conocen efectos adversos graves a las dosis recomendadas.

P: ¿Precio en Reset Peptides?

Ovagen 20 mg → \$1,487 MXN por vial.

P: ¿Cómo almaceno el vial?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días. No congelar después de reconstituir.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado