

PEG-MGF

Pegylated Mechano Growth Factor · Protocolo de Uso y Dosificación

Crecimiento muscular sostenido • Mayor vida media • Activación de células satélite prolongada

¿Qué es el PEG-MGF?

El **PEG-MGF** (Pegylated Mechano Growth Factor) es la versión modificada del MGF, al que se le ha añadido una molécula de **polietilenglicol (PEG)**. Este proceso, llamado pegilación, ralentiza drásticamente la absorción del péptido por el cuerpo, alargando su vida media de unos pocos minutos a varios días. Esto permite una estimulación más prolongada de las células satélite musculares con menos inyecciones. Es ideal para un **crecimiento muscular sostenido** y una reparación continua de los tejidos.

Crecimiento sostenido

Mayor vida media

Reparación prolongada

Activación de células satélite

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico.
PASO 2	El vial es de 2 mg. Añada 2 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Injecte el agua por la pared interior del vial, lentamente.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver por completo. NO agitar.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días.

Concentración resultante: 2 mg en 2 ml = 1 mg/ml. Cada 0.1 ml (10 unidades) = 100 mcg de PEG-MGF.

Protocolo de Dosificación

El PEG-MGF se aplica vía subcutánea o intramuscular, generalmente 2-3 veces por semana, gracias a su vida media prolongada.

NIVEL	DOSIS POR APLICACIÓN	UNIDADES (vial 2 mg + 2 ml BAC)	FRECUENCIA	DURACIÓN
Principiante	200-300 mcg	20-30 u	2 veces por semana	4-6 semanas
Intermedio	300-400 mcg	30-40 u	2 veces por semana	6-8 semanas
Avanzado	400-500 mcg	40-50 u	3 veces por semana	6-8 semanas

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen (subcutáneo) o músculo entrenado (intramuscular)
Técnica	Pellizque la piel para vía subcutánea, o inserte a 90° para intramuscular; inyecte lentamente
Rotación	Cambie el punto de inyección en cada aplicación
Momento	Un horario consistente, no es necesario aplicar inmediatamente post-entreno
Frecuencia	2-3 veces por semana según el nivel del protocolo

Preguntas Frecuentes

P: ¿En qué se diferencia del MGF normal?

Su principal ventaja es la comodidad, gracias a su mayor vida media. Mientras que el MGF normal requiere inyecciones diarias o post-entreno (efecto local y agudo), el PEG-MGF se administra solo dos o tres veces por semana para un efecto más sostenido y sistémico.

P: ¿Cuándo se notan los resultados?

Al actuar de forma más sostenida sobre la activación de las células satélite, los efectos sobre la recuperación y el crecimiento muscular suelen consolidarse a partir de las 3-4 semanas de uso constante, siendo más notorios hacia el final del ciclo.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Sí. Es común combinarlo con péptidos liberadores de GH (como CJC-1295 + Ipamorelin) para potenciar el entorno anabólico general, o con BPC-157 para apoyar la recuperación de lesiones durante periodos de entrenamiento intenso.

P: ¿Tiene efectos secundarios?

Es generalmente bien tolerado a las dosis recomendadas. Puede causar leve molestia o enrojecimiento en el sitio de inyección. No se recomienda exceder la duración del ciclo para evitar la desensibilización de los receptores.

P: ¿Precio en Reset Peptides?

PEG-MGF 2 mg → \$1,113 MXN por vial.

P: ¿Cómo almaceno el vial?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días. No congelar después de reconstituir.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado