

PT-141 (Bremelanotide)

Protocolo de Uso y Dosificación - Reset Peptides

Agonista de melanocortina • Aumento del deseo sexual • Función eréctil • TDSH

¿Qué es el PT-141?

El **PT-141** (Bremelanotide) es un agonista de los receptores de melanocortina (MC3R y MC4R) en el sistema nervioso central. Actúa directamente en el cerebro para aumentar el deseo sexual y la excitación en hombres y mujeres. A diferencia de los inhibidores de la PDE5 (Viagra, Cialis) que actúan sobre los vasos sanguíneos del pene, el PT-141 actúa sobre la libido central, por lo que es útil para personas con deseo sexual bajo, disfunción eréctil de origen psicógeno, o trastorno del deseo sexual hipoactivo (TDSH) en mujeres. Es el único péptido aprobado por la FDA para esta indicación (en mujeres premenopáusicas).

Aumenta la libido

Actúa a nivel cerebral

Ayuda en disfunción eréctil

Aprobado para TDSH femenino

Advertencia importante:

El PT-141 puede causar náuseas intensas en algunos usuarios, especialmente a dosis estándar. También produce bronceado (por activación de MC1R). No usar más de una vez cada 24 horas, y máximo 8 veces al mes.

Reconstitución del Vial

PASO 1 Limpie el tapón con alcohol.

PASO 2 El vial es de 10 mg. Añada 2 ml de agua bacteriostática.

PASO 3 Inyecte por la pared interior, lentamente.

PASO 4 Gire suavemente hasta disolver.

PASO 5 Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días.

Concentración resultante:

10 mg / 2 ml = 5 mg/ml → cada 0.1 ml (10 unidades) = 0.5 mg (500 mcg).

Precio Reset Peptides: PT-141 10 mg → \$738 MXN

Protocolo de Dosificación

El PT-141 se aplica vía subcutánea en el abdomen, 30-60 minutos antes de la actividad sexual. La dosis estándar recomendada es 1.75 mg (aprox. 35 unidades en nuestra reconstitución). No se recomienda microdosificación (dosis fraccionadas a lo largo del día) porque es muy difícil de medir con jeringas domésticas y puede provocar efectos impredecibles.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

NIVEL	DOSIS ÚNICA	UNIDADES (Vial 10 mg + 2 ml BAC)	FRECUENCIA	DURACIÓN DEL EFECTO
Principiante (probar tolerancia)	0.5 mg (500 mcg)	10 unidades	Una vez, evaluar náuseas	4-6 horas
Estándar	1.75 mg	35 unidades	Máximo 1 vez cada 24h	6-12 horas
Máxima (si tolera bien)	2.5 mg	50 unidades	Máximo 8 veces al mes	8-12 horas

Importante: La dosis de 0.5 mg es para prueba de tolerancia. Si no produce náuseas o efectos adversos, la siguiente vez use 1.75 mg. Si con 1.75 mg tiene náuseas intensas, reduzca a 1 mg (20 unidades) la próxima vez.

Microdosificación (no recomendada para principiantes): Algunos usuarios experimentados dividen 1.75 mg en 5-10 microdosis a lo largo del día (ej. 0.35 mg cada 2 horas). Esto es imposible de medir con jeringas de insulina (0.35 mg = 7 unidades, que es medible pero hay que inyectarse muchas veces). Si el cliente insiste, recomiende diluir el vial con 10 ml de agua (concentración 1 mg/ml → 1.75 mg = 17.5 unidades, más fácil). Pero mejor evitar.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen (subcutáneo)
Técnica	Pellizcar, inyectar lento
Rotación	Cambie de punto cada vez
Momento	30-60 minutos antes de la actividad sexual
Frecuencia	Máximo 1 vez al día, 8 veces al mes

¿Cuándo se Nota el Efecto?

Tiempo	Efecto esperado
15-30 minutos	Comienza la sensación de calor, hormigueo, y aumento del deseo.
1-2 horas	Pico del efecto: mayor excitación, erecciones más frecuentes (en hombres), lubricación (en mujeres).
6-12 horas	El efecto puede durar todo el día. Muchos usuarios reportan erecciones espontáneas.
24 horas	El efecto desaparece completamente.

Este documento es de uso exclusivo para clientes de Reset Peptides.

El uso de este péptido es bajo responsabilidad del usuario. Consulte a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier protocolo.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Es como el Viagra?

R: No. El Viagra actúa sobre los vasos sanguíneos del pene; el PT-141 actúa sobre el cerebro, aumentando el deseo sexual. Pueden usarse juntos (con cuidado).

P: ¿Por qué causa náuseas?

R: Porque los receptores de melanocortina también están en el área postrema del cerebro, que regula el vómito. Las náuseas suelen ser dosis-dependientes. Comenzar con una dosis baja (0.5 mg) ayuda a tolerarlo.

P: ¿Puedo tomarlo si tengo presión alta?

R: Puede aumentar ligeramente la presión arterial. Consulte a su médico si tiene hipertensión no controlada o enfermedad cardiovascular.

P: ¿Se puede usar a diario?

R: No. La FDA recomienda máximo 8 dosis al mes. El uso más frecuente puede causar tolerancia o efectos secundarios.

P: ¿Produce bronceado?

R: Sí, porque activa el receptor MC1R de la piel. Con el uso repetido, puede oscurecer la piel (similar a Melanotan). Es normal.

P: ¿Cuánto dura el vial reconstituido?

R: 30 días en nevera. No congelar.

¿Tienes más dudas?

resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado