

Survodutide

Protocolo de Uso y Dosificación

Doble agonista de Glucagón/GLP-1 • Máxima pérdida de peso y mejora hepática

¿Qué es el Survodutide?

El **Survodutide** es un agonista dual de los receptores de **GLP-1** y **glucagón**. Al activar el GLP-1, reduce el apetito y mejora el control de la glucosa. Al activar el receptor de glucagón, estimula directamente el gasto energético y la quema de grasa en el hígado. Esta combinación lo convierte en una herramienta de vanguardia para la pérdida de peso, el control de la diabetes tipo 2 y, de forma destacada, para apoyar el manejo de la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), una enfermedad hepática grave.

Agonista dual	Máxima pérdida de peso	Mejora hepática (MASH)	Quema de grasa
---------------	------------------------	------------------------	----------------

Reconstitución del Vial

PASO 1	Limpie el tapón del vial con alcohol isopropílico.
PASO 2	El vial es de 10 mg. Añada 2 ml de agua bacteriostática.
PASO 3	Inyecte el agua por la pared interior del vial, lentamente.
PASO 4	Gire suavemente hasta disolver por completo. NO agitar.
PASO 5	Refrigere a 2-8°C. Vida útil: 30 días.

Concentración resultante: 10 mg en 2 ml = 5 mg/ml. Cada 0.1 ml (10 unidades) = 0.5 mg de Survodutide.

Protocolo de Dosificación

El Survodutide se administra vía subcutánea, **una vez por semana**. La escalada de dosis es gradual, similar a otros agonistas de GLP-1, para minimizar molestias gastrointestinales.

NIVEL	DOSIS SEMANAL	UNIDADES (vial 10 mg + 2 ml BAC)	DURACIÓN
Principiante	0.3-0.6 mg	6-12 u	4 semanas
Intermedio	1.2-1.8 mg	24-36 u	8 semanas
Avanzado	2.4-4.8 mg	48-96 u	12 semanas
Máximo (estudios)	6.0 mg	120 u	Variable

■ La dosis "Máxima" corresponde a los niveles utilizados en estudios clínicos bajo supervisión médica. La escalada hacia dosis altas debe realizarse gradualmente y siempre observando la tolerancia individual, especialmente a nivel gastrointestinal.

Cómo Aplicarlo Correctamente

Zona	Abdomen, muslo o brazo (subcutáneo)
Técnica	Pellizque la piel, inserte la aguja a 45-90° e inyecte lentamente
Rotación	Cambie el punto de inyección cada semana entre las zonas disponibles
Momento	Un día fijo a la semana, con o sin alimentos, a la misma hora
Frecuencia	1 vez por semana, escalando la dosis gradualmente según tolerancia

Preguntas Frecuentes

P: ¿Es superior a la Tirzepatida o Semaglutida?

Ofrece un mecanismo diferente. La adición de la actividad glucagónica proporciona una quema de grasa más directa, especialmente a nivel hepático. Los estudios muestran una pérdida de peso muy potente, comparable o superior a otros agonistas de GLP-1 disponibles.

P: ¿Cuáles son los efectos secundarios?

Puede causar náuseas y malestar gastrointestinal, similares a otros agonistas de GLP-1. Al activar el receptor de glucagón, no se recomienda en personas con antecedentes de hipoglucemia. La escalada gradual de dosis ayuda a minimizar estos efectos.

P: ¿Cuánto tarda en notar resultados?

La reducción del apetito suele notarse desde las primeras dosis. La pérdida de peso significativa y la mejora en marcadores hepáticos se observan progresivamente a lo largo de las 8-12 semanas de tratamiento, con resultados más consolidados a mayor duración.

P: ¿Se puede combinar con otros péptidos?

Generalmente no se recomienda combinarlo con otros agonistas de GLP-1 o glucagón para evitar sobredosificación de las mismas vías. Sí puede complementarse con péptidos de soporte como 5-Amino-1MQ o NAD+ para apoyar el metabolismo durante la pérdida de peso, siempre bajo supervisión.

P: ¿Precio en Reset Peptides?

Survodutide 10 mg → \$3,114 MXN por vial.

P: ¿Cómo almaceno el vial?

Liofilizado: temperatura ambiente en lugar fresco y seco. Reconstituido: refrigerar a 2-8°C y usar en un máximo de 30 días. No congelar después de reconstituir.

P: ¿Quién no debería usar Survodutide?

No se recomienda en personas con antecedentes de hipoglucemia, pancreatitis, enfermedad de la vesícula biliar, ni en personas con antecedentes personales o familiares de cáncer medular de tiroides o síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Consulte siempre a su médico antes de iniciar.

¿Tienes más dudas?
resetpeptides.mx

Atención al cliente disponible Lunes a Sábado